

Консультация - Шаповалова Яна Викторовна - врач-психиатр (26.02.2015)

Вид мед.обслуживания: Амбулаторный прием (1) Место обслуживания: Поликлиника (1) Цель (повод) обращения: Консультативный (2) Состояние пациента Удовлетворительное (1)

Жалобы: Со слов матери, на отставание в психоречевом развитии.

История жизни:

Ребенок от 1 беременности, протекавшей на фоне миопии высокой степени, хронического пиелонефрита. Во 2 половине-повышение АД, гестоз. Роды на сроке 32-33 недели путем Кесарево сечение. Масса 210, рост 46 см, Апгар 7/76. Состояние с рождения тяжелое, переведен в ОНД ВОДБ. Состоял на учете у невролога. Оперирован по поводу каверномы ворот печени, внепеченочной портальной гипертензии. Получал лечение: Кортексин курсами, Глиатилин. На фоне Глиатилина появилась лепетная речь. Прошли курс ТКМП №6 в Вологде.

Рекомендации

1. Контроль ЭЭГ 1 раз в 6 мес.
2. Капли назальные Семакс, 0,1% по 1 капле в каждую ноздрю – 1 раз в день – до 15 ч. – 2 раза в неделю, месяц. (март 2015 г.)
3. р-р Глиатилина 100мг/4мл, по 2мл в/м, через день, №10. (апрель 2015 г.)
4. Сироп Пантогам 100мг/мл, начинать с 3 мл/сутки, постепенно увеличивая дозу в течение недели до 10мл/сутки, принимать в течение 2х недель, далее постепенно снижать дозу до полной отмены в течении недели. (май 2015 г.)
5. Раствор Нооклерин 20%, по 1ч. ложке внутрь утром до 15ч, месяц (июнь 2015г.)
6. Р-р Церебролизин 1,0 мл, вводить по 1 мл в/м № 10, через день – до 15ч. (июль 2015 г.)
7. р-р Церебрум композитум 2,2 мл, 1\2 содержимого ампулы (1,1 мл) растворить в 50 мл воды, принимать через рот по 25 мл х 2 раза в день – до 18ч. – 2 раза в неделю – 1 месяц (август 2015 г.)
8. Наблюдение врача-психиатра по месту жительства.

Основной диагноз

Задержка психоречевого развития резидуально-органического генеза.

Код МКБ

F06.828

Подпись:

Шаповалова Я.В.



Печать: 26.02.2015 12:36:42 - Врач 4 отделения